

Jose C. Cortez, MD  
George M. Seremetis, MD  
Danielle Sweeney, MD  
Amanda Hodge, RN, CPNP  
Sarah Bushner, RN, CPNP



Children's Urology  
1301 Barbara Jordan Blvd., Suite 302  
Austin, Texas 78723  
Phone: (512)472-6134  
Fax: (512)472-2928

## **Instrucciones de cuidado después de Meatotomía (meatoplastia)**

### **¿Qué es un Meatotomía (meatoplastia)?**

El meato uretral es la abertura en la punta del pene. A veces, la abertura es demasiado pequeña y hace que el paso de la orina difícil. Un meatotomía (meatoplastia) Es un procedimiento para ampliar la apertura.

### **Cuidados en el hogar**

Después de la meatotomía se hace esto, es importante: Extienda la apertura de tres (3) veces por día a la hora del baño para evitar que los bordes de la apertura neuva se cierre de nuevo. Esto se debe hacer por lo menos durante 1-2 semanas, o más si los bordes están todavía en bruto y se pegan. Asegúrese de mantener limpia la apertura al tener a su hijo en la bañera de inmersión durante 5-10 minutos al día.

El ungüento de A & D se puede utilizar en el pañal o una gasa en su ropa interior para mantener la apertura que se pegue a la ropa.

### **Información adicional**

No es inusual tener una pequeña cantidad de sangrado de la apertura o sangre en la orina. Esto puede durar varios días. La mayoría de los niños no experimentan mucho dolor después de la meatotomía. Su niño puede, sin embargo, tienen un poco de ardor o molestia al orinar, esto es normal. Puede usar Tylenol para el dolor si es necesario. Siga las instrucciones en la botella para la dosis correcta. No hay restricciones sobre las actividades de su hijo.

**Si usted tiene alguna pregunta o inquietud por favor no dude en llamar a la enfermera de Urología (512) 472-6134. Durante horas no laborables por favor llame al (512) 406-3112 y pida hablar con el urólogo de guardia.**