

Jose C. Cortez, MD
George M. Seremetis, MD
Leslie T. McQuiston, MD
Vani S. Menon, MD
Kelly J. Nast, MD
Mary "Katie" Wang, MD



Children's Urology
1301 Barbara Jordan Blvd., Suite 302
Austin, Texas 78723
PHONE: (512) 472-6134
FAX: (512) 472-2928
After Hours: (512) 406-3112
www.childrensurology.com

Meatoplastia

Cuidado Postoperatorio

CUIDADOS EN EL HOGAR

No hay restricciones de actividad para su hijo siguiendo este procedimiento. No se necesita vendaje. Puede reanudar sus actividades normales el día después de su procedimiento. Evite los juguetes a horcadas durante 1 semana después de la cirugía. Si su hijo tiene suturas, se disolverán con el tiempo. Las suturas pueden tardar de 4-8 semanas en disolverse completamente.

Después de que se realiza la meatotomía, es importante:

Aplique un poco de pomada antibiótica o vaselina en la abertura y extienda la abertura, si es necesario, cuatro (4) veces al día, y durante el baño, para evitar que los bordes de la nueva abertura se vuelvan a unir. Esto debe hacerse a partir del día de la cirugía y durante al menos dos semanas, o más si es necesario. Si su hijo usa pañales, aplique la pomada con cada cambio de pañal. El baño puede comenzar el día después de la cirugía.

INFORMACION ADICIONAL

No es inusual tener una pequeña cantidad de sangrado por la abertura, o tener sangre en la orina, después de la cirugía. Esto puede durar varios días.

Se puede producir un chorro de orina o pulverización desviada durante varias semanas después de la cirugía. **¡ESTO ES NORMAL!**

La mayoría de los niños no experimentan mucho dolor después de la meatotomía. Sin embargo, su hijo puede tener algo de ardor o incomodidad al orinar. Esto es **NORMAL**. Considere aplicar ungüento en la punta del pene inmediatamente antes de orinar para lubricar el área. También puede usar **Tylenol o Motrin** para el dolor si es necesario. Siga las instrucciones en la botella para la dosis correcta. Si no puede orinar, permítale sentarse en un baño tibio y orinar en el agua. También es posible que le receten medicamentos para el dolor mas fuertes para usar en los primeros días después del procedimiento.

CUANDO LLAMAR A LA OFICINA

- Fiebre más de 101.5° F
- Su hijo no puede orinar
- Hay sangrado activo (por goteo) en el sitio de la cirugía
- Su hijo no puede retener líquidos (vómitos)
- Tiene otras preguntas / inquietudes

Si tiene alguna pregunta o inquietud durante el horario comercial habitual, no dude en llamar a la Enfermera de Urología al (512) 472-6134 extensión 103.

Durante el horario no comercial, llame al (512) 406-3112 y solicite hablar con el urólogo de guardia.