

Reimplante ureteral Cuidado Postoperatorio

RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES

Durante los primeros uno o dos días después de la cirugía, es posible que su hijo no tenga ganas de estar muy activo. Durante 2 a 4 semanas después de la cirugía, no se le debe permitir a su hijo participar en ninguna actividad extenuante, incluido levantar objetos pesados, deportes de contacto y clases de gimnasia. No nadar durante 2 semanas después del procedimiento.

DIETA

Antes de que su hijo sea dado de alta del hospital, debe poder beber líquidos claros y retenerlos sin vomitar. Una vez que tu hijo sea capaz de beber líquidos, podrá añadir progresivamente a su dieta con:

1. Una comida completa líquida o “ligera”, que puede incluir tostadas, galletas saladas, sopa o gelatina.
2. Comidas regulares si su hijo tolera lo anterior.

Si su hijo vomita, espere aproximadamente 45 minutos y comience nuevamente este proceso con sorbos de líquidos claros. Aumente gradualmente la cantidad de líquidos claros. Cuando su hijo pueda tolerarlos, siga las pautas anteriores.

CUIDADO DE LA INCISIÓN

A su hijo se le colocará pegamento quirúrgico sobre las incisiones; no es necesario retirarlo y se desprenderá por sí solo. Si las heridas o incisiones comienzan a verse infectadas (puede notar enrojecimiento inusual o secreción) o la hinchazón se vuelve excesiva, notifique a nuestra oficina.

Los signos de infección incluyen:

- Fiebre
- Enrojecimiento o hinchazón excesivos
- Cualquier drenaje parecido al pus de la incisión.

EXPECTATIVAS POSTOPERATORIAS

Durante la cirugía, es posible que a su hijo le inserten un stent; de ser así, es posible que sienta la necesidad de orinar con más frecuencia. Esto es normal y probablemente se deba a la irritación del stent en la vejiga. Su hijo también puede experimentar dolor de riñón o dolor en el lado afectado. Debe esperar que la orina sea rosada o teñida de sangre con pequeños coágulos. Esto puede continuar mientras el stent esté colocado. Su hijo puede sentir ardor y/o dolor al orinar. Si tiene problemas para orinar, colóquelo en un baño tibio y anímelo a beber agua.

BAÑO Y DUCHA

Puede bañar o duchar a su hijo 48 horas después de la cirugía. Hasta entonces, déle a su hijo baños de esponja y evite el lugar de la incisión. Una vez que comience a bañarse o ducharse, no frote agresivamente el área quirúrgica. Lave suavemente alrededor de las incisiones y seque esa área con palmaditas después del baño. Para los niños que usan pañales, si las heces entran en contacto con la incisión/el vendaje/el catéter, simplemente escurra una toalla húmeda y jabonosa sobre el área y luego dé palmaditas para limpiar y secar.

DOLOR

Se le recetará Tylenol con hidrocodona (Hycet o Norco), si es apropiado. Si se les proporciona un analgésico narcótico, la mayoría de los niños sólo lo necesitarán durante 1 a 3 días después de la cirugía. Los analgésicos narcóticos pueden causar estreñimiento, por lo que se debe controlar. Si su hijo tiene estreñimiento, comience con Miralax, 1 tapa al día o dos veces al día hasta que se reanuden las deposiciones blandas diarias. Si esto no tiene éxito, notifique a nuestra oficina. Si su hijo está amamantando exclusivamente, puede usar un supositorio de venta libre para ayudar con el estreñimiento. A partir del día después de la cirugía, puede comenzar a alternar Children's Tylenol y Motrin como se indica en el paquete. Su médico puede recetarle otros medicamentos, quien le explicará cómo usarlos. ****NO use Children's Tylenol y Hycet o Norco juntos (use uno O el otro), ya que esto puede provocar una sobredosis de Tylenol.**

OTROS MEDICAMENTOS

Si a su hijo le han colocado un stent después de la cirugía, es posible que le receten otros dos medicamentos:

1. Un antibiótico. Administre este medicamento según lo recetado. Un medicamento para los espasmos de la vejiga (Ditropan u Oxybutynin). A veces, el stent irrita la vejiga y provoca breves episodios de dolor/espasmos. Si esto ocurre, use el medicamento según lo recetado, cada 6 a 12 horas según sea necesario. El estreñimiento es un efecto secundario común de este medicamento

HACER UN SEGUIMIENTO

Su hijo tendrá un seguimiento quirúrgico en 4 a 6 semanas para una evaluación postoperatoria, a menos que se especifique lo contrario. Su médico puede ordenar una ecografía para esta visita. Si aún no tiene una cita programada, llame a nuestra oficina para concertarla.

CUÁNDO LLAMAR A LA OFICINA

- Fiebre superior a 101,5° F
- Su hijo no puede orinar
- Hay sangrado activo (goteo) en el sitio de la cirugía.
- Su hijo no puede retener líquidos (vómitos)
- Su hijo siente dolor a pesar del uso de los medicamentos recomendados.
- Tiene otras preguntas/preocupaciones

Si tiene alguna pregunta o inquietud durante el horario habitual de oficina, no dude en llamar a la enfermera de Urología al (512) 472-6134 extensión 103. Fuera del horario normal, llame al (512) 406-3112 y solicite hablar con el urólogo de guardia.